



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

03 ИЮН 2024

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Муравьинка®

(организация-разработчик: ООО «Аписфера 2000»

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 28-40)

Номер регистрационного удостоверения 77-3-12.12-0906№ПВР-3-1.5/01452

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Муравьинка® (Muravinka®).

Международное непатентованное наименование : муравьиная кислота

2. Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Муравьинка® содержит в качестве действующего вещества муравьиную кислоту — 85%, а в качестве вспомогательного компонента натрий-карбоксиметилцеллюлозу.

3. По внешнему виду представляет собой бесцветную гелеобразную массу с резким запахом муравьиной кислоты.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения — 2 года со дня производства. После первого вскрытия упаковки препарат хранению не подлежит. Запрещается использовать Муравьинку® по истечении срока годности.

4. Выпускают Муравьинку® упакованной по 30 г в пакетах из кислотопроницаемого нетканого материала, размером 40 x 70 мм, уложенных по 4 штуки в полимерные банки с контролем первого вскрытия. Каждую банку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Муравьинку® в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 0°C до 30°C.

6. Муравьинку® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Муравьинка® - акарицидный препарат.

10. Муравьиная кислота, входящая в состав препарата, обладает острым акарицидным действием против взрослых форм клещей *Varroa destructor*, *Acarapis woodi* и *Tropilaelaps* spp.

Муравьинка® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), обладает местно-раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктиву глаз.

Препарат не токсичен для пчел, в рекомендуемой препаративной форме и дозе не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей пчел, не накапливается в продуктах пчеловодства.

III. Порядок применения

11. Муравьинку® применяют при варроатозе, акарапидозе и тропилелапсозе пчел.

12. Противопоказано применение препарата при температуре внешнего воздуха ниже 12°C и выше 25°C. Лекарственный препарат запрещается применять для обработки семей пчел менее чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания препарата в товарный мёд.

13. При работе с препаратом Муравьинка® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, пользоваться резиновыми перчатками и респиратором.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Муравьиной®. В случае появления аллергических реакций или случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Препарат не предназначен для применения теплокровным животным.

15. Обработку пчелиных семей при варроатозе проводят двукратно, а при акарапидозе – трехкратно, с интервалом 5-7 дней из расчета 1 пакет на одну семью силой 5-12 улочек.

При тропилелапсозе, при слабой степени поражения (клещи *Tropilaelaps* еще не видны в гнездах пчел) рекомендовано 3-х кратное применение с интервалом 5 дней. При средней и сильной степени поражения (клещи видны на сотах, выбегают из ячеек с открытым расплодом и из ячеек с печатным

расплодом, при его вскрытии) рекомендовано 4-5-ти кратное применение с интервалом 5 дней из расчета 1 пакет на одну семью силой 5-12 улочек.

Обработку проводят одновременно во всех ульях на пасеке – весной, после первого осмотра пчел и в летне-осенний период после откачки товарного меда.

Перед применением вскрывают банку, извлекают пакет и располагают его на верхних брусках соторамок под холстиком. По мере испарения кислоты пакеты извлекают из ульев и утилизируют. В обрабатываемых семьях пчел должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

16. При применении препарата Муравьинка® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке препарата наблюдается беспокойство и выкучивание пчел из ульев. Не рекомендуется обрабатывать семьи пчел менее 5 улочек.

18. Сведения о несовместимости препарата Муравьинка® с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

21. Мед, полученный от семей, обработанных препаратом Муравьинка® в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

ООО НПЦ «Фокс и Ко»
117149, г. Москва
Симферопольский бульвар, д.8

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий
от потребителя

ООО НПЦ «Фокс и Ко»
117149, г. Москва
Симферопольский бульвар, д.8

Генеральный директор
ООО «Аписфера 2000»



Игнатьева Г.И.